

## Возраст: доношенные новорожденные

<b>Масса тела</b>	3-3,5 кг	<b>ЧСС</b>	110-160 в минуту	<b>ЧД</b>	30-40 в минуту	<b>Систолическое АД</b>	70-80 мм рт. ст
-------------------	----------	------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	--------------------

Дыхательные пути				
<b>Воздуховод:</b>	размер: 000	<b>Интубационная трубка</b>		
		Диаметр:	– с манжетой – без манжеты	2,5-3,0 3,0-3,5
<b>ЛМА:</b>	размер: 1	Длина (оральная интубация)		9-10 см

Сердечно-сосудистая система				
<b>Дефибрилляция</b> (4 Дж/кг)	20 Дж	<b>Адреналин</b>	<b>В/в — остановка сердечной деятельности</b> (10 мкг/кг)	0,4 мл (1 : 10 000)
<b>Атропин</b> (20 мкг/кг)	100 мкг (минимум)		<b>В/м — анафилаксия</b> (10 мкг/кг)	0,4 мл (1 : 10 000)
<b>Амиодарон</b> (5 мг/кг)	18 мг (0,6 мл minijet)		<b>Небулайзер — круп</b> (400 мкг/кг)	1,4 мл (1 : 1000)

Инфузионная терапия				
<b>Кристаллоиды:</b>	травма (10 мл/кг)	35 мл	<b>Кровь, СЗП или тромбоциты</b> (10 мл/кг)	35 мл
	другое (20 мл/кг)	70 мл		
<b>10 % раствор глюкозы:</b> (2 мл/кг)	<b>гипогликемия</b>	7 мл	<b>Маннитол 20 %</b> (0,25–0,5 г/кг)	4–8 мл (0,5 г/кг = 2,5 мл/кг)

Лекарственные средства			
Лекарственное средство (дозировка)	Без разведения или в разведении, мг/мл	Дозировка (на 3,5 кг)	Объем, мл
<b>Пропофол</b> (1–4 мг/кг)	Без разведения (10 мг/кг)	3-15 мг	0,3-1,5 мл
<b>Кетамин в/в</b> (2 мг/кг)	Без разведения (10 мг/кг)	7 мг	0,7 мл
<b>Фентанил</b> (1–2 мкг/кг)	Разведение до 10 мкг/мл	4-7 мкг	0,4-0,7 мл
<b>Морфин</b> (0,1 мг/кг)	Разведение до 1 мг/мл	0,3 мг (повторить при необходимости)	0,3 мл
<b>Парацетамол в/в</b> (10 мг/кг)	Без разведения (10 мг/кг)	35 мг	3,5 мл
<b>Суксаметоний</b> (2 мг/кг)	Разведение до 10 мг/мл	7 мг	0,7 мл
<b>Рокуроний</b> (1 мг/кг)	Без разведения (10 мг/кг)	3,5 мг	0,35 мл
<b>Атракурий</b> (0,5 мг/кг)	Без разведения (10 мг/кг)	2 мг	0,2 мл
<b>Сугаммадекс</b> (16 мг/кг)	Без разведения (100 мг/кг)	50 мг	0,5 мл
<b>Транексамовая кислота</b> (15 мг/кг)	Без разведения (100 мг/кг)	50 мг	0,5 мл
<b>10 % раствор кальция хлорида</b> (0,2 мл/кг)	Без разведения	0,7 мл	0,7 мл

Скорость инфузии		
Лекарственное средство	В шприце 50 мл	Скорость инфузии
<b>Пропофол</b> (4–12 мг/кг/ч)	Без разведения (10 мг/мл)	2-6 мл/ч
<b>Морфин</b> (10–40 мкг/кг/ч)	3,5 мг (1 мг/кг)	0,5–2 мл/ч (1 мл/ч = 20 мкг/кг/ч)
<b>Мидазолам</b> (60–240 мкг/кг/ч)	21 мг (6 мг/кг)	0,5–2 мл/ч (1 мл/ч = 120 мкг/кг/ч)
<b>Норадреналин/адреналин</b> (0,01–0,5 мкг/кг/мин)	1 мг (0,3 мг/кг) в 5 % растворе глюкозы	0,1–5 мл/ч (1 мл/ч = 0,1 мкг/кг/мин)