

Simplex Power

Стимулятор, активирующий защитную функцию растения и процесс метаболизма. Power укрепляет иммунитет растения и усиливает выработку смол. Гормоны, входящие в состав Power, повышают устойчивость растения к инфекциям, стимулируют развитие всех его частей, способствуют накоплению активных веществ. Стимулятор Power применяется по листу, и уже в течение нескольких минут после нанесения начинается ответная реакция растения.



Показания к применению

- Стимуляция выработки смолы и активных веществ
- Повышение устойчивости растения к инфекциям
- Стимулирование развития всех частей растения
- Укрепление иммунитета растения
- Повышение качества урожая

Условия применения


- Для открытого и закрытого грунта
- Для любых почвосмесей
- Для гидропонных систем любого типа

Фаза развития растения

- Начало цветения
- Развитие цветков
- Созревание

Состав Power

Хитозан
Растворимый магний (MgO)
Поликарбоновые кислоты
Комплекс витаминов



Таблицы применения



Стимуляторы

Период жизни растения

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Набор зеленой массы растения, начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
Osmos, мл/л	—	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	—
Taste¹, мл/л	—	0,5–1,0	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0
Solid², мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
Power³, мл/л	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—
Mass⁴, мл/л	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Vega⁵, мл/л	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Barrel⁶, мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
EC раствора (+EC воды)⁷	0,4–0,6	0,5–1,3	1,1–1,3	1,4–1,8	1,4–1,8	0,6–0,9	0,4–0,6
pH питательного раствора				6,5			

¹ Применяйте Taste начиная со второй недели вегетативного роста.

² Используйте Solid на третьей-четвертой неделе цветения.

³ Не используйте Power чаще чем через 2-3 недели после последней обработки. Использовать Power можно **только по листу!**

⁴ Не используйте Mass чаще чем через 1-2 недели после последней обработки.

⁵ Vega применяется по листу один раз за указанный период. Ослабленные неинфекционными хлорозами растения можно обработать раствором Vega в концентрации 2мл/л.

⁶ Barrel добавляется в последнюю очередь после внесения все компонентов. Повышает pH, необходим контроль pH раствора.

⁷ Максимальные значения EC рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение EC в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.