

Simplex Solid

Универсальный стимулятор цветения, который благодаря нейтральному уровню pH может использоваться совместно с любыми базовыми удобрениями. Solid компенсирует острую нехватку фосфора и калия на третьей-четвертой неделе цветения (в период «фосфорного окна»); укрепляет растение, минимизирует его возможный стресс и способствует формированию качественного урожая. Входящий в состав экстракт юкки сокращает риск заражения паразитной флорой в прикорневой зоне.



Показания к применению:

Восполнение дефицита фосфора и калия в период «фосфорного окна»

Условия применения:

- Для открытого и закрытого грунта
- Для любых почвосмесей
- Для гидропонных систем любого типа

Фаза развития растения:

- Развитие цветков

Состав Solid

НРК 0-8-9

Растворимый фосфор (P2O5) — 8%

Растворимый калий (K2O) — 9%

Магний (Mg)

Сера (SO3)

Поликарбоновые кислоты

L-глутаминовая кислота


Глицин

Бетаин (Витамин B4)

Биофульвокислоты



5 л



1 л



0,5 л

Таблицы применения



Стимуляторы

Период жизни растения

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Набор зеленой массы растения, начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
Osmos , мл/л	—	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	—
Taste ¹ , мл/л	—	0,5–1,0	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0
Solid ² , мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
Power ³ , мл/л	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—
Mass ⁴ , мл/л	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Vega ⁵ , мл/л	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Barrel ⁶ , мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
ЕС раствора (+ЕС воды) ⁷	0,4–0,6	0,5–1,3	1,1–1,3	1,4–1,8	1,4–1,8	0,6–0,9	0,4–0,6
рН питательного раствора				6,5			

¹ Применяйте Taste начиная со второй недели вегетативного роста.

² Используйте Solid на третьей-четвертой неделе цветения.

³ Не используйте Power чаще чем через 2-3 недели после последней обработки. Использовать Power можно **только по листу!**

⁴ Не используйте Mass чаще чем через 1-2 недели после последней обработки.

⁵ Vega применяется по листу один раз за указанный период. Ослабленные неинфекционными хлорозами растения можно обработать раствором Vega в концентрации 2мл/л.

⁶ Barrel добавляется в последнюю очередь после внесения все компонентов. Повышает рН, необходим контроль рН раствора.

⁷ Максимальные значения ЕС рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение ЕС в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.