



Основной запасной формой фосфора у растений является фитин. Он накапливается в семенах, составляя до 50% от общего фосфора в них

# ИЗАГРИ ФОСФОР

МАКСИМУМ ФОСФОРА  
В КОМПЛЕКСЕ С  
АМИНОКИСЛОТАМИ И  
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фосфор в высокой концентрации (277 г/л)
- Протеиногенные L-аминокислоты растительного происхождения
- Богатый спектр микроэлементов в хелатной форме
- Комплекс смачивающих веществ
- Высокая степень усвоения растениями (до 95%)
- Корректирует дефицит фосфора у растений в условиях низкого pH почв, весенних и осенних заморозков, засухи, затяжных дождей
- Совместим с распространенными СЗР и биопрепаратами


## Норма расхода

Некорневая подкормка: 1,0-4,0 л/га

Минимально 1 л/га в комплексе ИЗАГРИ Азот + ИЗАГРИ Фосфор + ИЗАГРИ Калий, максимально 4 л/га при остром дефиците, низких температурах почвы, в условиях слабой обеспеченности доступным фосфором.

Расход рабочего раствора -100 -300 л/га.

## Состав (% объемные, не менее)



\* микроэлементы в двойной хелатной форме (EDTA+ amino acids)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Фосфор ( $P_2O_5$ )          | 277 г/л |
| Азот общий (N)               | 97 г/л  |
| Калий ( $K_2O$ )             | 68 г/л  |
| Сера ( $SO_3$ )              | 5,3 г/л |
| Цинк* ( $Zn^*$ )             | 4,0 г/л |
| Магний ( $MgO$ )             | 2,7 г/л |
| Бор (B)                      | 2,3 г/л |
| Железо* ( $Fe^*$ )           | 1,6 г/л |
| Медь* ( $Cu^*$ )             | 1,3 г/л |
| Марганец* ( $Mn^*$ )         | 0,8 г/л |
| Молибден (Mo)                | 0,8 г/л |
| Кобальт* ( $Co^*$ )          | 0,2 г/л |
| L-аминокислоты               | 20 г/л  |
| Комплекс смачивающих веществ | 10 г/л  |

### Физические свойства

Концентрированный раствор буро-зеленого цвета  
 $\rho = 1,29-1,31 \text{ г/см}^3$

### Эффект от применения

- ✓ Предотвращает дефицит фосфора у растений
- ✓ Стимулирует развитие корневой системы при неблагоприятных условиях
- ✓ Оптимизирует рост и развитие растений
- ✓ Повышает устойчивость посевов к полеганию
- ✓ Усиливает устойчивость растений к болезням
- ✓ Ускоряет начало уборки урожая
- ✓ Обеспечивает прибавку урожая до 5-10 ц/га

### Регламент применения

| Культура                  | Норма расхода | Кратность обработок | Фаза применения                                         |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Клубни картофеля          | 1,0-2,0 л/3 т | 1                   | Предпосадочная обработка совместно с протравителем      |
| Яровые зерновые культуры  | 1,0-2,0 л/га  | 1                   | Кущение                                                 |
| Озимые зерновые культуры  | 1,0-2,0 л/га  | 1-2                 | 1. Осеннее кущение<br>2. Весеннее кущение               |
| Рапс                      | 1,0-2,0 л/га  | 1                   | 4-6 листьев                                             |
| Сахарная свекла           | 1,0-2,0 л/га  | 1-2                 | 1. Фаза 4-6 настоящих листьев<br>2. 50% смыкания рядков |
| Подсолнечник              | 1,0-2,0 л/га  | 1                   | 4-5 пар настоящих листьев                               |
| Кукуруза, сорго           | 1,0-4,0 л/га  | 1                   | 3-5 листьев                                             |
| Многолетние бобовые травы | 2,0 л/га      | 1                   | Отрастание/Стеблевание                                  |
| Картофель                 | 1,0-2,0 л/га  | 1-2                 | 1. Период интенсивного роста побегов<br>2. Рост клубней |