



Значительное количество бора в растении сосредоточено в цветках, особенно в рыльце и столбиках



## ИЗАГРИ БОР

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ  
УДОБРЕНИЕ, КОРРЕКТОР  
ДЕФИЦИТА БОРА

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая концентрация бора в органической форме (123,2 г/л)
- Быстрое усвоение за счет особого проникающего компонента
- Усилен специальным молибденовым комплексом
- Удобная и технологичная в применении жидкая форма
- Идеальная альтернатива традиционной борной кислоте

### Норма расхода

Некорневая подкормка: 0,5-1,5 л/га.

Расход рабочего раствора – 100-300 л/га.

### Физические свойства

Концентрированный прозрачный раствор  
 $\rho = 1,36-1,38 \text{ г/см}^3$

### Состав (% объемные, не менее)



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Проникающий агент            | 170 г/л   |
| Бор в органической форме (В) | 123,2 г/л |
| Азот общий (N)               | 55 г/л    |
| Сера (SO <sub>3</sub> )      | 52 г/л    |
| Молибден (Мо)                | 10 г/л    |

## Эффект от применения

- ✓ Стимулирует цветение, опыление и образование завязей
- ✓ Снижает процент пустоцвета и опадения завязи
- ✓ Обеспечивает оптимальное усвоение кальция растениями
- ✓ Усиливает устойчивость к засухе, низким температурам
- ✓ Повышает сахаристость корнеплодов и крахмалистость клубней
- ✓ Улучшает выполненность и масличность семян подсолнечника
- ✓ Помогает получить качественное зерно на семенных участках

## Регламент применения

| Культура              | Норма расхода | Кратность обработок | Фаза применения                                                                               |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахарная свекла       | 0,5-1,0 л/га  | 1-3                 | 1. Фаза 4-6 листьев<br>2. 50% смыкание рядков<br>3. Техническая спелость                      |
| Зернобобовые культуры | 0,5-1,0 л/га  | 1                   | Бутонизация                                                                                   |
| Рапс                  | 1,0 л/га      | 1                   | Бутонизация                                                                                   |
| Подсолнечник          | 0,5-1,0 л/га  | 1                   | Бутонизация                                                                                   |
| Лён                   | 0,5-1,0 л/га  | 1                   | Бутонизация                                                                                   |
| Картофель             | 0,5-1,0 л/га  | 1                   | Бутонизация – начало цветения                                                                 |
| Плодовые культуры     | 0,5-1,0 л/га  | 1-4                 | 1. Розовый (белый) бутон<br>2. Опадение лепестков<br>3. Рост плодов<br>4. После уборки урожая |
| Виноград              | 0,5-1,0 л/га  | 1-2                 | 1. Цветение<br>2. После уборки урожая                                                         |
| Овощные культуры      | 1,0-1,5 л/га  | 1                   | Бутонизация - цветение                                                                        |