

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Эйметерм раствора 2,5% для лечения и профилактики
кокцидиоза у сельскохозяйственных птиц

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия,
129329, г. Москва, ул. Кольская д.1).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эйметерм раствор 2,5% (Solutio Eimeterum 2,5%).

Международное непатентованное наименование: толтразурил.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Эйметерм раствор 2,5% в 1 мл в качестве действующего вещества содержит толтразурил – 25 мг, а также вспомогательные вещества триэтаноламин и полиэтиленгликоль.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от желтого до коричневого цвета (допускается опалесценция). Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 28 суток.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5, 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянных или полимерных флаконах соответствующей вместимости, снабженных крышками-капельницами и/или навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия, или резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками; по 500 мл в полимерных или стеклянных бутылках, по 1 л в полимерных бутылках, по 2,5; 3 и 5 л в полимерных канистрах, снабженных пробками с контролем первого вскрытия. Флаконы по 5, 10, 20, 50 и 100 мл упаковывают поштучно в картонные пачки. Допускается выпуск флаконов по 50 и 100 мл без вторичной упаковки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

6. Эймерм раствор 2,5% следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Эймерм раствор 2,5% относится к антикокцидийным препаратам группы триазинтриона.

10. Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на все стадии внутриклеточного развития (мерогонии и гамогонии) кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagriditis*, *Eimeria anseris*, *Eimeria truncata*, включая кокцидий, устойчивых к другим антикокцидийным средствам.

Толтразурил блокирует дыхательные ферменты и оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, вызывает гибель паразита.

После перорального введения препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма птиц в основном в неизмененном виде, а также в виде метаболитов с пометом.

Эймерм раствор 2,5% по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у птиц побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

III. Порядок применения

11. Эймерм раствор 2,5% назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям и уткам с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе, при появлении у птиц первых клинических признаков заболевания.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Запрещается применение Эймерм раствора 2,5% курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением препарата в яйцах.

13. Эймерм раствор 2,5% применяют птицам с водой для поения два

дня подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы (28 мл препарата на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам в течение 48 часов подряд

или

- 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания птиц лечение повторяют через 5 дней.

В период применения Эйметерма раствора 2,5% птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Лечебный раствор сохраняет свое действие в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

14. При передозировке у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Препарат предназначен для применения цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям и уткам.

17. В случае не соблюдения установленного срока повторного применения препарата при тяжелом течении кокцидиоза его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений у птиц при применении Эйметерм раствора 2,5% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

19. Эйметерм раствор 2,5% совместим с витаминами, кормовыми добавками и лекарственными препаратами, применяемыми в птицеводстве.

20. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, индеек, гусей и уток – не ранее, чем через 16 суток после последнего применения Эйметерм раствора 2,5%. В случае вынужденного убоя птиц ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Эйметерм раствора 2,5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эйметерм раствором 2,5%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эйметерм раствора 2,5%, утвержденная Россельхознадзором 20 июня 2011 года.

Наименование производственной производителя препарата для применения:	и площадки лекарственного ветеринарного	адрес ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1.
---	--	---

Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя:	адрес организации, держателем или регистрационного лекарственного претензий от	ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
--	--	---

Номер регистрационного удостоверения 77-3-12.16-3458 N ПВР-3-10.11/027 34